

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
AVA/アブラキサン	乳がん	軽度	/

順序	投与薬剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	グラニセトロンバッグ3mg100mL デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	30分	day1
③	生食100mL アブラキサン注260mg/m ²	1本	点滴(フィルター禁)	30分	day1
④	生食50mL	1本	点滴	ルートフラッシュ	day1
⑤	生食100mL アバスチン注10mg/kg	1本	点滴	初回90分 2回目60分 以降30分	day1
⑥	生食50mL	1本	点滴	ルートフラッシュ	day1
1コースの期間 21日		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
アブラキサン:末梢神経症状 アバスチン:高血圧、蛋白尿					
注意事項					
アブラキサンは特定生物由来製剤のため取り扱い注意。同意書取得必要。					

海南医療センター 化学療法委員会

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
PTX/AVA	乳がん	軽度	/

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	レスタミン錠5錠	5錠	内服	前投薬	day1、8、15
②	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1、8、15
③	生食50mL デキサート注3.3mg2A ガスター注20mg1A	1本	点滴	全開で	day1、8、15
④	生食50mL	1本	点滴	30分	day1、8、15
⑤	生食250mL パクリタキセル注90mg/m ²	1本	点滴 (フィルター 付きセット)	60分	day1、8、15
⑥	生食100mL アバスチン注10mg/kg	1本	点滴	初回90分 2回目60分 以降30分	day1、15
1コースの期間 28日		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
パクリタキセル: 末梢神経症状 アバスチン: 高血圧、蛋白尿					
注意事項					

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
パージェタ/ハーセプチン/DTX(初回・2回目以降)	乳がん	軽度	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	グラニセトロン注3mg100mL デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	30分	day1
③	5%ブドウ糖液250mL ドセタキセル注75mg/m ²	1本	点滴	60分	day1
④	生食250mL ハーセプチン注8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	1本	点滴	90分(初回) 30分(2回目以降)	day1
⑤	生食250mL パージェタ注840mg/Body(初回) 420mg/Body(2回目以降)	1本	点滴	60分(初回) 30分(2回目以降)	day1
1コースの期間 3週間毎		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
ハーセプチン:インフュージョンリアクション、心機能低下 ドセタキセル:末梢神経障害 パージェタ:インフュージョンリアクション					
注意事項					
ハーセプチンの前投薬として初回:ボルタレン坐剤25mgを使用					

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
EC	乳がん	高度	/

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	グラニセトロンバッグ3mg100mL デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	30分	day1
③	生食100mL エンドキサン注600mg/m ²	1本	点滴	30分	day1
④	生食50mL エピルビシン注60mg/m ²	1本	点滴	2-3分で点滴	day1
1コースの期間 21日		投与スケジュールおよび総コース数 4コース			
特徴的な副作用					
エピルビシン: 心毒性 エンドキサン: 出血性膀胱炎					
注意事項					
血管外漏出に注意					

海南医療センター 化学療法委員会

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
ハラヴェン単剤	乳がん	軽度	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1、8
②	グラニセトロン注3mg50mL	1本	点滴	30分	day1、8
③	生食50mL ハラヴェン注1.4mg/m ²	1本	点滴	2~5分かけて	day1、8
1コースの期間 3週間毎		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
ハラヴェン:末梢神経障害					
注意事項					

海南医療センター 化学療法委員会

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
FEC	乳がん	高度	/

順序	投与薬剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	グラニセトロンバッグ3mg100mL デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	30分	day1
③	生食50mL エピルビシン注100mg/m ²	1本	点滴	2-3分で点滴	day1
④	生食50mL 5-FU注500mg/m ²	1本	点滴	2-3分で点滴	day1
⑤	生食100mL エンドキサン注500mg/m ²	1本	点滴	30分	day1
1コースの期間 21日		投与スケジュールおよび総コース数 4-6コース			
特徴的な副作用					
エピルビシン: 心毒性 エンドキサン: 出血性膀胱炎					
注意事項					
血管外漏出に注意					

海南医療センター 化学療法委員会

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
ハーセプチン単剤	乳がん	最小	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	生食250mL ハーセプチン注8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	1本	点滴	90分(初回) 30分(2回目以降)	day1
1コースの期間 3週間毎		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
ハーセプチン: インフュージョンリアクション、心機能低下					
注意事項					

海南医療センター 化学療法委員会

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
HER/PTX	乳がん	軽度	/

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	レスタミン錠5錠 ★初回はボルタレン坐剤挿入30分 後から開始	5錠	内服	前投薬	day1
②	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
③	生食250mL ハーセプチン注4mg/kg(初回) 2mg/kg(2回目以降)	1本	点滴	90分(初回) 30分(2回目以降)	day1
④	生食50mL デキサート注3.3mg2A ガスター注20mg1A	1本	点滴	全開で	day1
⑤	生食50mL	1本	点滴	30分	day1
⑥	生食250mL パクリタキセル注80mg/m ²	1本	点滴 (フィルター 付きセット)	60分	day1
1コースの期間 毎週		投与スケジュールおよび総コース数 12週			
特徴的な副作用					
ハーセプチン: インフュージョンリアクション、心機能低下 パクリタキセル: 末梢神経症状					
注意事項					
ハーセプチンの前投薬として初回:ボルタレン坐剤25mgを使用					

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
PTX	乳がん	軽度	/

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	レスタミン錠5錠	5錠	内服	前投薬	day1、8、15
②	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1、8、15
③	生食50mL デキサート注3.3mg2A ガスター注20mg1A	1本	点滴	全開で	day1、8、15
④	グラニセトロン注3mg50mL	1本	点滴	30分	day1、8、15
⑤	生食250mL パクリタキセル注80mg/m ²	1本	点滴 (フィルター 付きセット)	60分	day1、8、15
1コースの期間 毎週		投与スケジュールおよび総コース数 4コース(12週)			
特徴的な副作用					
パクリタキセル: 末梢神経症状					
注意事項					

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
TC	乳がん	高度	/

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	グラニセトロンバッグ3mg100mL デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	30分	day1
③	生食250mL ドセタキセル注75mg/m ²	1本	点滴	60分	day1
④	生食100mL エンドキサン注600mg/m ²	1本	点滴	30分	day1
1コースの期間 21日		投与スケジュールおよび総コース数 4サイクル			
特徴的な副作用					
ドセタキセル: 末梢神経障害 エンドキサン: 出血性膀胱炎					
注意事項					

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
カドサイラ単剤	乳がん	軽度	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	生食250mL カドサイラ注3.6mg/kg	1本	点滴 (フィルター 付きセット)	90分(2回目以降30分)	day1
1コースの期間 3週間毎		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
カドサイラ: インフュージョンリアクション、心機能低下					
注意事項					

海南医療センター 化学療法委員会