

# 化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
AMR療法	小細胞肺がん	中等度	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1、2、3
②	グラニセトロン注3mg50mL デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	30分	day1、2、3
③	生食50mL アムルピシン注40mg/m <sup>2</sup>	1本	点滴	全開で	day1、2、3
1コースの期間 3週間		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
アムルピシン(カルセド):間質性肺炎					
注意事項					

# 化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
CBDCA/VP-16	小細胞肺がん	高度	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1、2、3
②	グラニセトロン注3mg100mL デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	30分	day1、2、3
③	生食500mL エトポシド注80mg/m <sup>2</sup>	1本	点滴	120分	day1、2、3
④	生食500mL カルボプラチン注5AUC	1本	点滴	120分	day1
1コースの期間 3週間		投与スケジュールおよび総コース数 4サイクル			
特徴的な副作用					
カルボプラチン:末梢神経障害					
注意事項					
アプレピタントを併用する。					

## 化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
CDDP/VP-16	小細胞肺がん	高度	/

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	ソルデム1号500mL	2本	点滴	終了まで持続点滴	day1
②	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day2、3
③	グラニセトロン注3mg100mL デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	30分	day1、2、3
④	生食500mL ラステット注100mg/m <sup>2</sup>	1本	点滴	120分	day1、2、3
⑤	ニソリM注500mL プリンペラン注	1本	点滴	120分	day1、2、3
⑥	生食500mL シスプラチン80mg/m <sup>2</sup>	1本	点滴	120分	day1
⑦	ソルデム3A500mL フロセミド注20mg0.5A	1本	点滴	120分	day1、2、3
1コースの期間 3週間		投与スケジュールおよび総コース数 4サイクル			
特徴的な副作用					
シスプラチン: 腎障害、末梢神経障害					
注意事項					
アプレピタントを併用する。					

# 化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
NGT	小細胞肺がん	軽度	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1-5
②	生食50mL デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	全開で	day1-5
③	生食100mL ノギテカン注1mg/m <sup>2</sup>	1本	点滴	30分	day1-5
1コースの期間 3週間		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
注意事項					

海南医療センター 化学療法委員会