

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
HER/SOX	胃がん	中等度	HER2陽性

順序	投与薬剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	生食250mL ハーセプチン注8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	1本	点滴	90分(初回) 30分(2回目以降)	day1
③	グラニセトロン注3mg50mL デキサート注3.3mg1A	1本	点滴	30分	day1
④	ブドウ糖液250mL オキサリプラチン100mg/m ² デキサート注3.3mg1A	1本	点滴	120分	day1
⑤	S-1 80mg/m ²	1日2回	点滴		day1~14
1コースの期間 3週間		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
オキサリプラチン:末梢血管障害・温罨法や点滴速度の延長も考慮。 ハーセプチン:インフュージョンリアクション、心機能低下					
注意事項					
★国内胃がんSOX PhaseⅢ試験によりオキサリプラチンの投与量は100mg/m ² とする。 ハーセプチンの前投薬として初回:ボルタレン坐剤25mgを使用					

海南医療センター 化学療法委員会

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
HER/XELOX	胃がん	中等度	HER2陽性

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	生食250mL ハーセプチン注8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	1本	点滴	90分(初回) 30分(2回目以降)	day1
③	グラニセトロン注3mg50mL デキサート注3.3mg1A	1本	点滴	30分	day1
④	ブドウ糖液250mL オキサリプラチン130mg/m ² デキサート注3.3mg1A	1本	点滴	120分	day1
⑤	カペシタビン1000mg/m ² /回	1日2回	点滴		day1~14
1コースの期間 3週間		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
カペシタビン: 手足症候群					
オキサリプラチン: 末梢血管障害・温罨法や点滴速度の延長も考慮。					
ハーセプチン: インフュージョンリアクション、心機能低下					
注意事項					
ハーセプチンの前投薬として初回: ボルタレン坐剤25mgを使用					

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
nabPTX単剤	胃がん	軽度	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	グラニセトロン注3mg50mL デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	30分	day1
③	生食100mL アブラキサン注260mg/m ²	1本	点滴(溶解 方法に注 意。 1Vあたり 生食20mL で溶解)	30分	day1
1コースの期間 3週間		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
アブラキサン:末梢神経症状					
注意事項					
アブラキサン:溶解マニュアル参照すること。					

海南医療センター 化学療法委員会

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
オプジーボ	胃がん	最小	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	生食100mL オプジーボ240mg/Body	1本	点滴	30分(フィルター付き輸液セット)	day1
1コースの期間 2週間		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
オプジーボ:免疫関連副作用(間質性肺炎、大腸炎/下痢、肝機能障害、1型糖尿病、下垂体機能障害)					
注意事項					

海南医療センター 化学療法委員会

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
PTX	胃がん	軽度	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	レスタミン錠5錠	5錠	内服	前投薬	day1、8、15
②	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1、8、15
③	生食50mL デキサート注3.3mg2A ガスター注20mg1A	1本	点滴	全開で	day1、8、15
④	グラニセトロン注3mg50mL	1本	点滴	30分	day1、8、15
⑤	生食250mL パクリタキセル注80mg/m ²	1本	点滴 (フィルター 付きセット)	60分	day1、8、15
1コースの期間 3週連続・1週休薬		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用 パクリタキセル:末梢神経症状					
注意事項					

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
RAM単剤	胃がん	最小	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	レスタミン錠10mg5錠	5錠	内服	前投薬	day1
②	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
③	生食250mL サイラムザ注8mg/kg	1本	30分(フィルター付き 輸液セツ)	60分	day1
1コースの期間 2週間		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
サイラムザ: 高血圧 蛋白尿					
注意事項					

海南医療センター 化学療法委員会

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
RAM/nabPTX	胃がん	中等度	/

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	レスタミン錠10mg5錠	5錠	内服	前投薬	day1、15
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1、8、15
②	グラニセトロン注3mg50mL デキサート注3.3mg1A	1本	点滴	30分	day1、8、15
④	生食250mL サイラムザ注8mg/kg	1本	30分(フィルター付き 輸液セツ	60分	day1、15
③	生食100mL アブラキサン注100mg/m ²	1本	点滴(溶解 方法に注 意。 1Vあたり 生食20mL で溶解)	30分	day1、8、15
1コースの期間 3週連続・1週休薬		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
サイラムザ: 高血圧 蛋白尿 アブラキサン: 末梢神経症状					
注意事項					
アブラキサン: 溶解マニュアル参照すること。					

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
RAM/PTX	胃がん	中等度	/

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	レスタミン錠10mg5錠	5錠	内服	前投薬	day1、8、15
②	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1、8、15
③	生食100mL ガスター注20mg デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	全開で	day1、8、15
④	生食250mL サイラムザ注8mg/kg	1本	30分(フィルター付き 輸液セツ)	60分	day1、15
⑤	生食50mL	1本	点滴	30分	day8
⑥	生食250mL パクリタキセル注80mg/m ²	1本	点滴(フィルター付き セツ)	60分	day1、8、15
1コースの期間 3週連続・1週休薬		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
サイラムザ: 高血圧 蛋白尿 パクリタキセル: 末梢神経症状					
注意事項					

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
SOX	胃がん	中等度	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	グラニセトロン注3mg50mL デキサート注3.3mg1A	1本	点滴	30分	day1
③	ブドウ糖液250mL オキサリプラチン100mg/m ² デキサート注3.3mg1A	1本	点滴	120分	day1
④	S-1 80mg/m ²	1日2回			day1～14
1コースの期間 3週間		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
オキサリプラチン:末梢血管障害・温罨法や点滴速度の延長も考慮。					
注意事項					
★国内胃がんSOX PhaseⅢ試験によりオキサリプラチンの投与量は100mg/m ² とする。					

海南医療センター 化学療法委員会

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
SP	胃がん	高度	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	ソルデム1号500mL	2本	点滴	終了まで持続点滴	day8
②	グラニセトロン注3mg50mL デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	30分	day8
③	ニソリM注500mL プリンペラン注	1本	点滴	120分	day8、9、10
④	生食500mL シスプラチン60mg/m ²	1本	点滴	120分	day8
⑤	ソルデム3A500mL フロセミド注20mg0.5A	1本	点滴	120分	day8、9、10
⑥	S-1 80mg/m ²		内服		day1～21
1コースの期間 5週間		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
シスプラチン: 腎障害、末梢神経障害					
注意事項					
アプレピタントを併用する。					

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
XELOX	胃がん	中等度	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	グラニセトロン注3mg50mL デキサート注3.3mg1A	1本	点滴	30分	day1
③	ブドウ糖液250mL オキサリプラチン130mg/m ² デキサート注3.3mg1A	1本	点滴	120分	day1
④	カペシタビン1000mg/m ² /回	1日2回			day1～14
1コースの期間 3週間		投与スケジュールおよび総コース数 8コース(術後補助化学療法)			
特徴的な副作用					
カペシタビン: 手足症候群 オキサリプラチン: 末梢血管障害・温罨法や点滴速度の延長も考慮。					
注意事項					
術後補助、切除不能進行再発					