

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
ジェブタナ	前立腺がん	軽度	/

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	レスタミン錠5錠	1本		開始前	day1
②	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
③	生食50mL ガスター注1A デキサー注3.3mg2A	1本	点滴	全開で	day1
④	生食50mL	1本	点滴	30分	day1
⑤	生食250mL ジェブタナ注25mg/m ²	1本	点滴 (フィルター 付き輸液 セット)	60分	day1
1コースの期間 3週間		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用 ジェブタナ: 骨髄抑制・・・ジーラスタを翌日に投与					
注意事項 プレドニゾン内服を併用					

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
DTX	前立腺がん	軽度	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	生食500mL ドセタキセル注75mg/m ²	1本	点滴	2時間	day1
1コースの期間 3週間		投与スケジュールおよび総コース数			
特徴的な副作用					
ドセタキセル:末梢神経障害					
注意事項					

海南医療センター 化学療法委員会

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
GC	膀胱がん	高度	/

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1、8、15
②	グラニセトロン注3mg50mL デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	30分	day1、2、8、15
③	生食100mL ゲムシタビン注1000mg/m ²	1本	点滴	30分	day1、8、15
④	ソルデム1号500mL	2本	点滴	終了まで持続点滴	day2
⑤	ニソリM注500mL プリンペラン注	1本	点滴	120分	day2、3、4
⑥	生食500mL シスプラチン70mg/m ²	1本	点滴	120分	day2
⑦	ソルデム3A500mL フロセミド注20mg0.5A	1本	点滴	120分	day2、3、4
1コースの期間 4週間		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
シスプラチン: 腎障害、末梢神経障害 ゲムシタビン: 血管炎					
注意事項					

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
GC (21日用)	膀胱がん	高度	/

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL (ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1、8
②	グラニセトロン注3mg50mL デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	30分	day1、2、8
③	生食100mL ゲムシタビン注1000mg/m ²	1本	点滴	30分	day1、8
④	ソルデム1号500mL	2本	点滴	終了まで持続点滴	day2
⑤	ニソリM注500mL プリンペラン注	1本	点滴	120分	day2、3、4
⑥	生食500mL シスプラチン70mg/m ²	1本	点滴	120分	day2
⑦	ソルデム3A500mL フロセミド注20mg0.5A	1本	点滴	120分	day2、3、4
1コースの期間 3週間		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
シスプラチン: 腎障害、末梢神経障害 ゲムシタビン: 血管炎					
注意事項					

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
GEM/CBDCA	膀胱がん	高度	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1、2、8、15
②	グラニセトロン注3mg100mL デキサート注3.3mg2A	1本	点滴	30分	day1、2、8、15
③	生食100mL ゲムシタビン注1000mg/m ²	1本	点滴	30分	day1、8、15
④	生食250mL カルボプラチン注AUC5	1本	点滴	60分	day2
1コースの期間 4週間		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用					
カルボプラチン:末梢神経障害 ゲムシタビン:血管炎					
注意事項					

化学療法レジメン

レジメン名称	対象がん種	催吐リスク	適応
キイトルーダ	尿路上皮がん	軽度	

順序	投与薬剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
①	生食250mL(ルートキープ)	1本	点滴	終了までルートキープ	day1
②	生食100mL キイトルーダ注200mg/Body	1本	点滴(フィルター付き 輸液セット)	30分	day1
1コースの期間 3週間		投与スケジュールおよび総コース数 PDまで			
特徴的な副作用 キイトルーダ:間質性肺炎、大腸炎/下痢、肝機能障害、1型糖尿病、下垂体機能障害					
注意事項					

海南医療センター 化学療法委員会